La plaie fut simplement couverte et les cuisses
rapprochées et fixées a l'aide d'une bande: le
malade fut saigné 2 fois dans les 12 heures et on mit
pour boisson une limonade nitrée et édulcorée;
on lui prescrivit de plus le repos le plus parfait et
le plus absolu. 2 jours s'étant écoulés il ne sortoit
presque plus de sang, le ventre étoit dans le
meilleur état possible on lui accorda alors quelques
bouillons. enfin quand on n'apperçut plus de sang
et que la suppuration fut bien établie, le malade
fut moins gêné, et guérit radicalement en quelques
semaines.

tel est le précis de cette observation qui me paroit devoir
être conservée; elle met hors de doute l'inutilité tant
des ligatures que des compressions violentes qui étoient
en usage autrefois après l'amputation de cette partie
et quoique l'auteur n'ait fait aucune mention des moyens
quil a employé antérieurement, je pense quil mérite
de la part de l'academie des remercimens.

ce 1 D. bre 1791. Baget D. M.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BAGET
ARC 18 d.3 n° 38

Sur un tentaule arraché dans un moment de desespoir. —

Rapport d'une observation envoyée a L'Academie par M. Guquelin Medecin a monbcontour en Bretagne

un jeun homme agé d'environ Go ans habituellement d'une bonne santé au huitieme jour d'une fievre inflammatoire bilieuze etant meme sur le declin de sa maladie, apprit une nouvelle a la quelle il fut si sensible qu'il demanda un couteau a un viellard seul pour lors a le garder et qui ne put lui refuser. bientot après paroissant dans la plus grande tranquilité, il jette sur le carreau avec le couteau dont il s'etoit pourvu le testicule qu'il venoit d'arracher, en disant, <u>va tu t'en repentiras</u>:

Dit l'auteur de cette observation

Appelés aussitot au secours de ce jeune homme nous reconnumes le testicule et la portion de cordon a la quelle il tenoit, qui etoit longue d'environ 7 pouces et ses parois dechirés obliquement aux trois quarts. une plaie transversale longue et demie peu profonde a la partie superieure et laterale gauche du scrotum et de la verge, et une seconde verticale dans toute la longueur du scrotum et anterieurement par la quelle il prit et arracha le testicule de ce coté. rien (continuetit M. guquelin) ne nous a paru appartenir a la continuité des vaisseaux ~~[illegible]~~spermatiques. l'hemoragie n'etoit point considerable

telle est l'exposition que fait ~~fait donne~~ M. guquelin de cette interessante observation.